

**Листок-вкладыш – информация для пациента**

**Деринат® , 2,5 мг/мл, раствор для местного и наружного применения**  
Действующее вещество: дезоксирибонуклеат натрия

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки, или медицинской сестры.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 5 дней, Вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Деринат® и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Деринат®.
3. Применение препарата Деринат®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Деринат®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Деринат® и для чего его применяют**

Препарат Деринат® содержит действующее вещество дезоксирибонуклеат натрия и является иммуностимулятором.

**Показания к применению**

Деринат® показан к применению у взрослых и детей с 0 до 18 лет.

**Монотерапия:**

- острые респираторные заболевания (ОРЗ);
- профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);
- воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта.

**Комплексная терапия:**

- хронические воспалительные заболевания, грибковые, бактериальные и другие инфекции слизистых в гинекологии;
- острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей (ринит, синусит, гайморит, фронтит);
- облитерирующие заболевания нижних конечностей;
- трофические язвы, длительно незаживающие и инфицированные раны (в том числе при сахарном диабете);
- гангрена;
- ожоги, обморожения;
- геморрой;
- постлучевые некрозы кожи и слизистых.

**Способ действия препарата Деринат®**

Препарат активизирует процессы клеточного и гуморального иммунитета, стимулирует работу иммунных клеток (В-лимфоцитов, Т-хелперов). Деринат® активизирует естественные защитные механизмы, позволяя организму эффективно бороться с бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, а также стимулирует обновление клеток и восстановление поврежденных тканей. Способствует заживлению трофических язв различного происхождения, быстрому заживлению глубоких ожогов. При применении препарата для лечения эрозий и язв на слизистой оболочке происходит безрубцовое восстановление пораженной ткани. Препарат не обладает негативным действием на эмбрион, не вызывает онкологические заболевания.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 5 дней применения, необходимо обратиться к врачу.

## **2. О чем следует знать перед применением препарата Деринат®**

### **Противопоказания**

Не применяйте препарат Деринат®, если у Вас аллергия на дезоксирибонуклеат натрия или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Деринат® проконсультируйтесь с лечащим врачом, или работником аптеки, или медицинской сестрой.

### **Другие препараты и препарат Деринат®**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

При местном применении препарат Деринат® не совместим с мазями на жировой основе и перекисью водорода, это может привести к снижению его эффекта.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При необходимости назначения препарата Деринат® в период беременности следует оценить ожидаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода.

В период грудного вскармливания применять по назначению врача.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Применение препарата Деринат® не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

## **3. Применение препарата Деринат®**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки, медицинской сестры. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

### **Рекомендуемая доза:**

Взрослые:

При ОРЗ, ОРВИ препарат закапывают в нос по 2-3 капли в каждый носовой ход или по 1 – 2 распыления в каждый носовой ход через каждые 1-1,5 часа, в течение первых суток; далее – по 2-3 капли или по 1 распылению в каждый носовой ход 3-4 раза в день, продолжительность курса – 1 месяц.

Для профилактики ОРВИ закапывают в нос по 2 капли или по 1 распылению в каждый носовой ход 2-4 раза в день в течение 1-2 недель.

При воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта производят полоскание препаратом 4 – 6 раз в сутки (1 флакон - 1-2 полоскания) или препарат равномерно распыляют на соответствующие повреждённые участки слизистой, по 2-3 распыления 4-6 раз в сутки. Продолжительность курса лечения 5-10 дней.

При хронических воспалительных заболеваниях, грибковых, бактериальных и других инфекциях слизистых в гинекологии – внутривагинальное введение с орошением шейки матки или внутривагинальное введение тампонов с препаратом по 5 мл на процедуру, 1-2 раза в сутки в течение 10-14 дней.

При острых и хронических заболеваниях верхних дыхательных путей (ринит, синусит, гайморит, фронтит), препарат закапывают по 3-5 капель или по 1-2 распыления в каждый носовой ход 4-6 раз в день. Продолжительность курса – 7-15 дней.

При облитерирующих заболеваниях нижних конечностей препарат закапывают в нос по 1-2 капли в каждый носовой ход 6 раз в день, продолжительность курса до 6 месяцев.

При геморрое препарат назначают в виде микроклизм в прямую кишку по 15-40 мл. Продолжительность курса лечения 4-10 дней.

При постлучевых некрозах кожи и слизистых оболочек, при длительно незаживающих и инфицированных ранах, ожогах, обморожениях, трофических язвах различной этиологии, гангренах на пораженные места накладывают аппликационные повязки (марля в два слоя) с нанесением на нее препарата 3-4 раза в течение дня или проводят обработку пораженной поверхности препаратом из распылителя 4-5 раз в сутки по 10-40 мл (курс лечения – 1-3 месяца).

#### **Применение у детей и подростков**

Препарат назначают детям с первого дня жизни. Режим дозирования для детей от 0 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Деринат® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При гангренозных процессах под действием препарата отмечается самопроизвольное отторжение некротических масс в очагах поражения с восстановлением кожного покрова. При открытых ранах и ожогах наблюдается анальгезирующее действие.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государственных членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### **Российская Федерация**

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, Россия, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03, +7 (499) 578-06-70, +7 (499) 578-02-20

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
<https://roszdravnadzor.gov.ru>

#### Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А. Иманова, д. 13

Телефон: +7 (7172) 235 135

Электронная почта: farm@dari.kz

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.ndda.kz>

#### Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», Республиканская клинично-фармакологическая лаборатория

Адрес: 220045, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 83, корпус 15

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.rceth.by>

### **5. Хранение препарата Деринат®**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке после слова «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Срок годности препарата – 5 лет.

Содержимое вскрытого флакона использовать в течение двух недель.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

#### **Препарат Деринат® содержит**

Действующее вещество: дезоксирибонуклеат натрия.

Каждый мл содержит 2,5 мг дезоксирибонуклеата натрия.

Каждый флакон содержит 25 мг дезоксирибонуклеата натрия в 10 мл раствора.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

#### **Внешний вид препарата Деринат® и содержимое упаковки**

Раствор для местного и наружного применения.

Прозрачная бесцветная жидкость, без посторонних включений.

Препарат Деринат® доступен в следующем варианте упаковки:

По 10 мл во флаконы из бесцветного или коричневого стекла, герметично укупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками алюминиевыми.

По 10 мл во флаконы-капельницы из бесцветного или коричневого стекла, герметично укупоренные крышками-пипетками, снабженными устройством контроля первого вскрытия.

По 10 мл во флаконы из бесцветного или коричневого стекла, укупоренные насадками-распылителями горизонтального или вертикального типа, снабженные колпачками защитными.

Флакон или флакон-капельницу, или флакон с насадкой-распылителем, с листком-вкладышем помещают в пачку из картона коробочного.

**Держатель регистрационного удостоверения**

ООО «ФармПак»

127521, Россия, г. Москва, Анненский проезд, домовладение 7, стр. 1.  
тел.: +7(495) 739-52-98.

**Производитель**

ООО «ФЗ Иммунолекс»

105318, Россия, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 27.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация:

ООО «ФармПак»

127521, Россия, г. Москва, Анненский проезд, домовладение 7, стр. 1.  
тел.: +7(495) 739-52-98, сайт: [www.derinat.com](http://www.derinat.com).

**Листок-вкладыш пересмотрен**

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <https://eec.eaeunion.org>.